

"美亞" 膿化清膠囊200毫克 (乙醯半胱胺酸)

ACETIN CAPSULES 200MG (ACETYLCYSTEINE) "MAYER"

衛署藥製字 第 025939 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本劑有液化粘液作用，能將粘性及膿性分泌物及痰分解。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量

每膠囊含：

Acetylcysteine..... 200mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Starch、Magnesium stearate、Capsule shell(Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Purified Water)。

2 用途(適應症)

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(慢性氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

3.2.2 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 65歲以上。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與含酒精飲料併服。

3.4.5 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

4 用法用量

用法	一天3次
年齡	12歲以上
每次用量	1粒

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有任何不適情形產生。

5.1.2 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

5.1.3 消化道:偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氧氣溢出等不悅感。偶有發疹等過敏症狀。
其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

6 包裝

6~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

7 儲存方式

避光室溫儲存。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

台裕化學製藥廠股份有限公司

新竹縣竹東鎮頭重里員山路 1 1 巷 1 3 弄 1 號

藥商

台灣美亞藥品股份有限公司

台中市西區精忠街 1 5 號